

03

ФУНГИЦИДЫ

Фунгициды – препараты предназначенные для борьбы с заболеваниями различных культур.



Тebuкoнaзoл 250 г/л.



Эмульсия масляно водная.



5 л.



Срок годности – 3 года.



фунгицид

ЦАРИЦА

Назначение: Системный фунгицид для обработки зерновых колосовых культур в период вегетации против видов ржавчин, септориоза, мучнистой росы, септориозногельминтоспориозных пятнистостей и пирикулярриоза на рисе. Оказывает лечебный эффект при уже начавшемся поражении. Быстро проникает и распространяется внутри растения, устойчив к воздействию осадков.

Относится к демитилирующим ингибиторам (DMI фунгициды), действие которых основано на процессе ингибирования биосинтеза стерина, а именно C-4-демитилазы в синтезе стерина патогенными организмами. После проникновения препарата, производство эргостерина прекращается, происходит накоплении промежуточных продуктов синтеза, что приводит к нестандартной мембранной структуре, изменению свойств мембраны (например, ее проницаемости), аномальному росту патогена, снижению воспроизводства и в конечном итоге – отмиранию клетки.

- Быстро проникает в растение;
- Устойчиво к воздействию осадков;
- Комплексное действие на патогены профилактическое и лечащее.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая и озимая	0,5	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Пшеница яровая	0,75–1,0	Септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Пшеница озимая	0,75–1,0	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Пшеница озимая	1,0	Септориозно–гельминтос–пориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Ячмень яровой	0,75–1,0	Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Ряпс	0,5	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Рис	0,5–1,0	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Яблоня	0,5–1,0	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500 л/га	30 (2)
Виноград	0,5–1,0	Оидиум, милдью	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500 л/га	30 (2)
Соя	0,5–1,0	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Лук	0,5–1,0	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300–350 л/га	30 (2)
Картофель	0,5–1,0	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300–350 л/га	30 (2)
Томаты	0,5–1,0	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300–350 л/га	30 (2)



Пропиконазол 300 г/л +
тебуконазол 200 г/л.



Концентрат эмульсии.



5 л.



Срок годности – 3 года.



фунгицид

АНТИКЛЕС 50%

Назначение: Системный фунгицид широкого спектра действия. Обладает защитными, лечебными и искореняющими свойствами. Фунгицид для обработки зерновых колосовых в борьбе с самыми вредоносными заболеваниями листьев, стебля и колоса – видов ржавчин, септориоза, мучнистой росы, фузариозов, септориозногельминтоспориозных пятнистостей, а также альтернариоза и фомоза рапса и церкоспороза, мучнистой росы, фомоза и оидиума винограда. Оказывает лечебный эффект при уже начавшемся поражении. Быстро проникает и распространяется внутри растения, устойчив к воздействию осадков.

- Профилактика и лечение болезней.
- Стимуляция корневой системы и всхожести семян.
- Повышение стрессоустойчивости (засуха, заморозки).
- Усиливает действие других фунгицидов.
- Низкая норма внесения, что снижает затраты.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница озимая	0,3-0,4	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1)
Пшеница яровая	0,3-0,4	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1)



Пропиконазол 200 г/л +
тебуконазол 200 г/л.



Концентрат эмульсии.



5 л.



Срок годности – 3 года.



фунгицид

ЗЕБРА 400

Назначение: Системный фунгицид широкого спектра действия. Обладает защитными, лечебными и искореняющими свойствами. Фунгицид для обработки зерновых колосовых в борьбе с самыми вредоносными заболеваниями листьев, стебля и колоса – видов ржавчин, септориоза, мучнистой росы, фузариозов, септориозногельминтоспориозных пятнистостей, а также альтернариоза и фомоза рапса и церкоспороза, мучнистой росы, фомоза и оидиума винограда. Оказывает лечебный эффект при уже начавшемся поражении.

Быстро проникает и распространяется внутри растения, устойчив к воздействию осадков.

Системный фунгицид против широкого спектра заболеваний зерновых, колосовых, винограда, свеклы и другие;

Устойчив к воздействию осадков.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая	0,15–0,25	Бурая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)
Свекла сахарная	0,2–0,25	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га	30 (1)

-  Дифеноконазол 250 г/л.
-  Концентрат эмульсии.
-  1 л.
-  Срок годности – 3 года.



фунгицид

ДИКОР

Назначение: Дикор к. э. (дифеноконазол, 250 г/л) контактный и системный фунгицид, предназначенный для профилактики и лечения ряда заболеваний плодовых культур.

Приготовление рабочей жидкости осуществляется на стационарных пунктах или с помощью передвижных агрегатов (АПР, «Темп» или АПЖ-12), позволяющих тщательно размешивать препарат с водой в специальных емкостях. Указанные агрегаты позволяют приготовленную рабочую жидкость фильтровать и с помощью насосов подавать в емкости опрыскивателей. Перед началом работы опрыскивателя необходимо включить мешалку.

-  Достаточно длительное, профилактическое и лечащее действие;
-  Быстрое проникновение в ткани растений;
-  Способность сдерживать вторичное заражение;
-  Проникает в растение в течении 2-х часов;
-  На плодовых культурах защищает не только листья, но и плоды;
-  Применяется на посевах лука, свеклы;
-  Возможно чередование препаратами других химических групп.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Яблоня	0,2-0,3 л/га	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,02% эмульсией препарата	20 (4)



Гидроксид меди 770 г/кг.



Смачивающийся порошок.



1 кг.



Срок годности – 3 года.



фунгицид

КОСЕЙТ 770

Назначение: Фунгицид контактного действия для защиты растений от множества заболеваний. Неорганический медный состав выступает контактным действующим агентом в большом перечне препаратов защиты растений, и оказывает профилактические и лечебные действия против грибковых и бактериальных заболеваний.

Приготовление рабочей жидкости осуществляется на стационарных пунктах или с помощью передвижных агрегатов (АПР, «Темп» или АПЖ-12), позволяющих тщательно размешивать препарат с водой в специальных емкостях.

- Легко использовать благодаря низкой норме;
- Препарат не пылит – отсутствует негативное воздействие на работающих;
- Высокая стабильность формуляции при хранении;
- Легко и быстро растворяется в воде;
- Низкая способность к пенообразованию;
- Раствор дольше остается в стабильном состоянии;
- Улучшенная способность к распылению, отсутствие забивания форсунок;
- Улучшенная устойчивость к смыву дождем;
- Совместимость в баковых смесях.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода г/кг	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Яблоня	1,2-2,0 кг/га	Парша, плодовая гниль, бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га	3 (3)



Манкоцеб 640 г/кг +
Металаксил 80 г/кг.



Смачивающийся порошок.



1 кг.



Срок годности – 3 года.



фунгицид

АГРОМИЛ ГОЛД

Назначение: Фунгицид Агромил Голд, с. п. следует применять в строгом соответствии сданными рекомендациями. Препарат должен применяться профилактически, т. е. до появления видимых симптомов развития болезни на культурных растениях.

После последней обработки фунгицидом Агромил Голд, с. п. (не позднее, чем через 7 дней) следует проводить опрыскивание контактными фунгицидами.

- Обладает профилактическим, лечащим и искореняющим контактно- системным действием;
- Применяется на картофеле, винограде и овощных культурах;
- Действует в течении 1 часа, усиливает эффект созданием защитного слоя на поверхности листьев;
- Эффективная защита от заражения снаружи и внутри.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода г/кг	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Картофель	2,5	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	15 (3)
Лук	2,5	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	15 (3)
Огурцы открытого грунта	2,5	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	6 (3)
Томаты открытого грунта	2,5	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	10 (3)
Виноград	2,5	Милдью	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)