

02

ГЕРБИЦИДЫ

Гербицид – средство химической защиты растений, используемые для борьбы с сорной растительностью (преимущественно, травянистой).



Трибенурон-метил 750 г/кг.



Водно-диспергируемые гранулы.



500 гр.



Срок годности – 3 года.



гербицид

МАДЖЕСТИК

Назначение: Данный препарат эффективен против широкого спектра трудно контролируемых сорняков, особенно таких как осот, подмаренник цепкий и др., широкое окно внесения – от появления 2-х листьев до флагового листа культуры. Низкая норма внесения (10–20 г/га), что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Остановка роста сорняков через 2–3 часа, гибель через 2–3 недели. Дождь, выпавший через 3 часа после обработки, не снижает эффективности препарата. Селективен по отношению к пшенице, ячменю и ржи. Наибольшая эффективность – от стадии 3 листьев до первого междоузлия культуры, что соответствует стадии развития сорняков от 3 до 6 листьев.

- Низкая норма применения препарата;
- 100% растворимость в воде;
- Низкая гектарная себестоимость.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая и озимая, ячмень	10–20	Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д осоты	Опрыскивание посевов в фазу культуры 2–3 листьев до выхода в трубку	– (1)
Подсолнечник	30	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры 2–8 листьев и ранние фазы роста сорняков	– (1)

-  Бентазон 480 г/л.
-  Водный раствор.
-  10 л.
-  Срок годности – 3 года.



гербицид

БЕНАГРО

Назначение: Гербицид для защиты сельскохозяйственных культур от однолетних двудольных сорняков. Обладает выраженным контактным действием и поглощается преимущественно зелеными частями растений. Действующее вещество прерывает реакцию фотосинтеза. Отмирание сорняков проявляется через 3-5 суток.

-  Эффективен против большого спектра сорных растений;
-  Не фитотоксичен для культуры при различных погодных условиях;
-  Эффективен с первого применения;
-  Универсальное средство, обработка возможна в любую из стадий вегетации;
-  Допускается использование гербицида на полях с подсевом;
-  Хорошая селективность;
-  Безопасен для последующих культур в севообороте;
-  Легко и быстро растворяется в воде;
-  При правильной дозировке можно ограничиться единственным опрыскиванием.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Зерновые яровые с подсевом люцерны	2,0	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Кукуруза	2,0-4,0	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Лен	3,0-4,0	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Рис	2,0-4,0	Клубнекамыш, сусак, сыть, мохохория, виды рогоза, частуха	Опрыскивание посевов в фазе 2-листьев – кущения культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Соя	1,5-3,0	Однолетние двудольные, в том числе дурнишник	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Люцерна 1-го года вегетации (семенные посевы)	2,0	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1



2,4-Д кислоты в виде
2-этилгексилового эфира 905 г/л.



Концентрат эмульсии.



10 л/20 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ГЕКСИЛЕН 905

Назначение: Гербицид системного и избирательного действия, предназначенный для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур.

Применение Гексилен 905, к. э. в посевах зерновых колосовых культур наиболее эффективно в фазе кущения культуры. Норма расхода Гексилен 905, к. э. составляет 0,6–0,8 л/га.

Для получения стабильного и высокодисперсного раствора необходимо на половину заполнить бак опрыскивателя водой, добавить необходимое количество Гексилен 905, к. э., перемешать в течение 10–15 секунд, затем медленно наполнить бак водой. Гексилен 905, к. э. используют однократно в течение одного вегетационного периода в фазу кущения зерновых до выхода в трубку. Первые признаки эффективности наблюдаются через 12–18 часов.

- Быстрое проникновение в ткани растений;
- Низкая дозировка применения препарата;
- Экономия затрат.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	0,4–0,6	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	–1
Кукуруза	0,6–0,8	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3–4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	–1



Глифосат 757 г/кг.



Водно-диспергируемые гранулы.



1 кг/10 кг.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ГЛИФАТ ФОРТЕ 757

Назначение: Глифат – это высококонцентрированный гербицид сплошного действия, содержащий 757 г/кг глифосата (или 75.7% действующего вещества), применяемый для уничтожения широкого спектра однолетних и многолетних злаковых, двудольных сорняков, а также древесно-кустарниковой растительности на паровых полях, землях несельскохозяйственного назначения и перед посевом культур. Препарат выпускается в виде водорастворимых гранул (ВГ/ВДГ) и обладает системным действием, перемещаясь по растению и уничтожая его корень, эффективен даже против устойчивых сорняков, таких как пырей и борщевик.

- Удобная тара;
- Быстрая и 100% растворимость;
- Низкая норма расхода;
- Уничтожение многолетних злаковых, особенно камыша.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пары	0,75-1,0	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	-1
	2,0-3,0	Многолетние сорняки в т. ч. гумай, тростник, пырей		
	3	Горчак розовый		
Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	2,0-3,0	Многолетние сорняки в т. ч. гумай, тростник, пырей	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, за 5-7 дней до посева или осенью	-1
	3	Горчак розовый		
	1,0-1,5	Однолетние злаковые и двудольные сорняки		



Глифосат калийная соль 540 г/л.



Водный раствор.



10 л/20 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ГЛИФОСАТ 540

Назначение: Гербицид сплошного действия, предназначенный для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков на парах и полях, предназначенных под посев зерновых и других с/х культур. Благодаря системному действию уничтожает надземную часть сорняков и их корневую систему. Визуально действие препарата можно наблюдать через 4–7 дней на однолетних и 10–14 дней – на многолетних сорняках. Прохладная погода может замедлить действие препарата. Период защитного действия – 1 месяц и более, до появления новой волны сорняков.

- Высокая концентрация и скорость действия;
- Высокая дождестойкость;
- Идеален для предпосевной и довсходовой обработки, а также для десикации.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пары	1,5–2,5	Однолетние и многолетние злаковые двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период активного роста. Расход рабочей жидкости – 200–300л/га	–1
	4,0	Горчак розовый (ползучий)	Опрыскивание сорняков в период активного роста. Расход рабочей жидкости – 200–300л/га	
Поля, предназначенные под посев различных с/х культур	1,5–2,0	Однолетние и многолетние злаковые двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости – 200–300л/га	–1
	1,5–2,5		Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости – 200–300л/га	



Фенмедифам 91 г/л + десмедифам 71 г/л + этофумезат 112 г/л.



Водно-диспергируемые гранулы.



5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ТРИОФЕН

Назначение: Триофен-селективный гербицид для послевсходового контроля однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и некоторых злаковых сорняков (куриное просо, щетинники, метлица полевая) в посевах сахарной, столовой и кормовой свёклы. Это эффективное средство от сорняков проникает непосредственно в клетки растения, разлагаясь и убивая сорные травы токсичными соединениями.

- Применение в течение всей вегетации культуры;
- Резкое подавление роста и деления клеток сорных растений в зависимости от нормы внесения и фазы их развития.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Свёкла сахарная	1,0	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки (куриное просо, щетинники, метлица полевая).	Опрыскивание посевов в стадии семядолей у сорняков (по 1-й, 2-й и 3-й волне). Расход рабочей жидкости 300-350 л/га.	– 3
Свёкла сахарная	1,5	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки (куриное просо, щетинники, метлица полевая).	Опрыскивание посевов в стадии 2–4 листьев у сорняков (по 1-й и 2-й волне). Расход рабочей жидкости 300-350 л/га.	– 2
Свёкла сахарная	3,0	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки (куриное просо, щетинники, метлица полевая).	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 300-350 л/га	– 1



Галоксифоп-Р-метил 108 г/л.



Концентрат эмульсии.



1 л/5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ГЕНЕРАЛ

Назначение: Послевсходовый системный гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах ряда сельскохозяйственных культур. Не действует на двудольные сорняки. Применяют в период активного роста сорняков. Важно, чтобы на них было достаточно листьев для быстрого поглощения действующего вещества. Обработку желательно проводить в сухую погоду. Не рекомендуется обрабатывать влажные растения. Однолетние злаковые сорняки опрыскивают в период их активного роста (в фазе от 2-4 листьев до кущения), многолетние злаковые – при их высоте 10-15 см. Сроки обработки не зависят от стадии развития культуры, однако культурные растения не должны закрывать собой сорняки, мешая их равномерному опрыскиванию.

- Совместимость в баковых смесях с другими гербицидами;
- Препарат поглощается в течении 1 часа после опрыскивания, поэтому последующие осадки не снижают его эффективность.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Свекла сахарная, хлопчатник, лен	0,5	Однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (фаза 2-6 листьев). Расход рабочей жидкости 250-300 л/га.	-1
Свекла сахарная	1,0	Пырей ползучий, гумай и другие многолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га.	-1
Хлопчатник	1,0-1,5	Многолетние злаковые (гумай, свинорой, пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га.	-1
Лен	1,0-1,5	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см.	-1
Подсолнечник, сафлор, соя, картофель	0,5-1,0	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га.	-1
Рапс	0,5-1,0	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га.	-1
Лук	1,0-1,5	Однолетние, многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 300-350 л/га.	-1

-  Оксифлуорфен 240 г/л.
-  Концентрат эмульсии.
-  1 л.
-  Срок годности – 3 года.



гербицид

ОКСИФЕН 240

Назначение: Оксифен – для защиты лука, чеснока и подсолнечника от однолетних сорняков. Высокоэффективен против широкого спектра однолетних, преимущественно двудольных сорняков, а также злаков контактным способом. Результат применения препарата – длительная защита выращиваемых культур и отсутствие ограничений для формирования севооборота.

-  Совместим с галоксифоп-Р-метилом, что позволяет контролировать широкий спектр сорных растений;
-  Не оставляет остатков.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Подсолнечник	1,0	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 250–300 л/га	–1
Лук (всех генераций)	0,5	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 250–300 л/га	–1
Лук (всех генераций)	1,0	Однолетние двудольные сорняки	Повторное опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 250–300 л/га	–1
Яблоня (сильно и среднерослые подвои)	4,2–8,4	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание весной вегетирующих сорняков высотой 10–15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости 500 л/га	–1
Сафлор	1,0	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 250–300 л/га	–1



Римсульфурон 250 г/кг.



Водно-диспергируемые гранулы.



100 гр.



Срок годности – 3 года.



гербицид

РИМУС 25%

Назначение: Послевсходовый гербицид для борьбы со всеми злаковыми сорняками и большинством двудольных сорняков. Гербицид используют для уничтожения злаковой и двудольной многолетней и однолетней сорной растительности в посадках кукурузы, посевного картофеля. Эффективен против всех злаковых, включая пырей и гумай, а также против большинства двудольных сорняков на посевах кукурузы.

Препарат используют в ранний период развития картофеля и кукурузы (1-4 или 2-6 листьев у культуры соответственно) по молодым сорнякам (высота пырея и других сорных злаковых трав не должна превышать 15 см; осот полевой в фазе образования розетки).

- Широкий спектр действия и диапазон сроков применения;
- Римсульфурон быстро разлагается в почве, поэтому не накладывает ограничений на севооборот при обычной ротации;
- Проникает в растения главным образом через листья, поэтому его эффективность не зависит от содержания влаги в почве;
- После обработки быстро перемещается по растениям к точкам роста, уже через несколько часов восприимчивые сорняки прекращают рост и больше не конкурируют с растениями в потреблении влаги и минеральных веществ;
- Безопасен для последующих культур в севообороте;
- Совместим в баковых смесях;
- Видимые симптомы появляются через 3-7 дней;
- Полная гибель чувствительных сорняков происходит через 15 и более дней;
- Низко токсичен для теплокровных.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Кукуруза (на зерно)	70-80 г/га + ПАВ Тренд 90, 200 мл/га	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры (в период начала кущения однолетних злаковых) при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)
Картофель	80 г/га + ПАВ Тренд 90, 200 мл/га	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания, при высоте культуры 5-20 см в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков, при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	- (1)



Квинклорак 250 г/л.



Концентрат суспензии.



5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

РИСУЛАМ 250

Назначение: Послевсходовый селективный гербицид системного действия для борьбы со злаковыми, двудольными и болотными сорняками (в т. ч. куриное просо, виды клубнекамышы) в посевах риса.

Препарат проникает в растения через листовую поверхность и частично через корневую систему. Действующее вещество гербицида Рисулам 250, к. с. ингибирует фермент ацетолактатсинтазу (АЛС) у чувствительных видов сорняков. Это приводит к остановке роста в течение нескольких часов после обработки.

Визуальные симптомы действия препарата на сорняки (хлороз, увядание, бурая окраска) проявляются обычно через 3-7 дней, а полная гибель сорняков наступает через 2-4 недели. Оптимальный срок применения начало кущения риса (4-6 листьев), фаза 2-5 листьев у клубнекамышы.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Рис	1,8-2,4	Однолетние злаковые (просовидные)	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - (2-4 листа у сорняков). Расход рабочей жидкости -200-300 л/га	-(1)



Пеноксулам + цигалафобутил
30 г/л + 150 г/л.



Масляная дисперсия МД.



5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

РИСТОКС

Назначение: Послевсходовый гербицид системного действия для борьбы с однолетними злаковыми (просовидные), осоковыми (клубнекамыш), и болотными сорняками в посевах риса.

Опрыскивание посевов в фазе от 1 листа – конец кушения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых, 6-7 листьев клубнекамыша, 2-4 листьев до середины кушения куриного просо). Перед опрыскиванием рекомендуется полностью отвести воду из чеков. Повторное затопление можно проводить не ранее 3-х дней после обработки. Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки пестицидом до конца восковой спелости риса (начало сентября). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га при наземном опрыскивании и 50-100 л/га при авиационном.

- Устойчивость к смыванию дождем;
- Стабилен в различных погодных условиях;
- Экономическая эффективность;
- Снижает затраты.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Рис	1,5-2,0	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш), и болотные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 1 листа – конец кушения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых, 6-7 листьев клубнекамыша, 2-4 листьев до середины кушения куриного просо). Перед опрыскиванием рекомендуется полностью отвести воду из чеков. Повторное затопление можно проводить не ранее 3-х дней после обработки. Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки пестицидом до конца восковой спелости риса (начало сентября). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га при наземном опрыскивании и 50-100 л/га при авиационном	– (1)



Феноксапроп-П-этил 69 г/л +
Мефенпирдиэтил (антидот) 75 г/л.



Эмульсия масляно-водная.



5 л/10 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ЗЛАКОСУПЕР 7,5 %

Назначение: Системный послевсходовый гербицид против однолетних злаковых сорняков на пшенице яровой и озимой. Опрыскивание посевов ярового ячменя и яровой пшеницы начинают по вегетирующим сорнякам в фазе от 2-го листа до начала кущения, не зависимо от фазы развития основной культуры. Опрыскивание посевов озимой пшеницы начинают рано весной по вегетирующим сорнякам. Первые признаки воздействия препарата проявляются в течение 24–48 часов. Полная гибель сорных злаков наблюдается в течение 10–15 дней после обработки. Препарат эффективно применяется по вегетирующим, злаковым сорнякам опрыскиванием в ранние фазы их развития (2–3 листа) не зависимо от фазы развития культуры.

- Благодаря антидоту препарат не угнетает культуру, сохраняя урожайность;
- Действующее вещество быстро разлагается в почве, не оставляя последствий;
- Быстрое действие препарата.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая, озимая	0,8–1,2	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (не зависимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	–(1)
Ячмень яровой, озимый	0,6–0,9	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (не зависимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	– (1)



Феноксапроп-П-этил 100 г/л +
Клоквинтоцет-мексил 27 г/л.



Концентрат эмульсии.



10 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ЗЛАКОФОРТЕ 100

Назначение: Системный послевсходовый гербицид против однолетних злаковых сорняков на пшенице яровой и озимой. Опрыскивание посевов ярового ячменя и яровой пшеницы начинают по вегетирующим сорнякам в фазе от 2-го листа до начала кущения, не зависимо от фазы развития основной культуры. Опрыскивание посевов озимой пшеницы начинают рано весной по вегетирующим сорнякам. Первые признаки воздействия препарата проявляются в течение 24–48 часов.

Полная гибель сорных злаков наблюдается в течение 10–15 дней после обработки. Препарат эффективно применяется по вегетирующим, злаковым сорнякам опрыскиванием в ранние фазы их развития (2–3 листа) не зависимо от фазы развития культуры.



Возможность работать по перерастающим сорнякам без угнетения злаковой культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая, озимая	0,6–0,9	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до конца кущения (не зависимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200–300л/га	–(1)



Клодинафоп-пропаргил 240 г/л +
клоквинтоцет-мексил 60 г/л.



Концентрат эмульсии.



5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ЗЛАКО ПИК

Назначение: Эффективный гербицид для защиты зерновых культур от особо злостных сорных растений. Опрыскивание посевов яровой пшеницы начинают по вегетирующим сорнякам в фазе от 3-го листа с добавлением прилипателя.

- Высокая эффективность;
- Безопасность для зерновых культур;
- Возможность применения в смесях (нет угнетения зерновой культурной группе растений).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая	0,1–0,15	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3–4-листа) с добавлением ПАВ Аптплюс 1 л/га. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	–1
	0,15	Щетинник, куриное просо		–1



Метрибузин 700 г/кг.



Смачивающийся порошок.



1 кг.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ТРИБУЗИН 700

Назначение: Селективный системный гербицид, имеет широкий спектр воздействия на однолетние двудольные и отдельные злаковые сорняки до и послевсходовом периоде их развития на картофеле, томатах и на сое. Препарат применяется один раз в течение сезона путем сплошного опрыскивания почвы. Картофель рекомендуется обрабатывать до появления всходов культуры, томаты из семян опрыскиваются в стадии 2–4 листков культуры, с нормой расхода 0,8 кг/га, на участках, отведенных под томаты рассадные, грунт опрыскивается до высаживания рассады за 15–20 дней, норма расхода 1,0–1,6 кг/га.

- Высокая концентрация;
- Длительная защита;
- Гибкие сроки применения;
- Безопасность для культур.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Томаты	1,0	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание растений через 15–20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 250–300 л/га	– 1
Картофель	0,7–1,4	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до и после всходов культуры Расход рабочей жидкости – 250–300 л/га	– 2
Соя (в условиях орошения)	0,6–0,8	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 250–300 л/га	– 1

-  Имазетапир 100 г/л.
-  Водный концентрат.
-  5 л.
-  Срок годности – 3 года.



гербицид

показать только вредный объект

ИМАЗЕТ 100

Назначение: Имазет – это концентрированный системный гербицид из группы имидазолинонов, используемый для уничтожения широкого спектра злаковых и двудольных сорняков (включая повилику и амброзию) в посевах сои, гороха, люпина и других бобовых культур, который ингибирует биосинтез аминокислот в сорняках, останавливая их рост.

-  Остаточная активность для сдерживания новых проростков сорных растений;
-  Системное проникновение вплоть до корней;
-  Умеренно опасен для человека.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Соя	1,0-1,2	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т. ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе 2-3 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 2 года – все культуры. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га.	-(1)
Люцерна	1,0	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т. ч. виды повилики	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после 1 укоса. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га.	-(1)

-  Пендиметалин 330 г/л.
-  Концентрат эмульсии.
-  10 л.
-  Срок годности – 3 года.



гербицид

КАЛКАН

Назначение: Калкан – это селективный почвенный гербицид на основе действующего вещества пендиметалин, который эффективно уничтожает однолетние злаковые и двудольные сорняки, создавая защитный экран в почве до появления всходов культур, таких как подсолнечник, кукуруза, картофель, морковь, лук и томаты. Препарат блокирует рост сорняков на ранних стадиях, всасываясь через корни и побеги, и выпускается в форме концентрата эмульсии.

 Защита от широкого спектра сорных растений в течение 2–3 недель.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Соя, хлопчатник, капуста рассадная, томаты, морковь, чеснок, подсолнечник	3,0–6,0	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов культуры или до высадки рассады	–(1)
Картофель	5,0	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы за 2–3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)	–(1)
Лук (всех генераций)	2,3–4,5	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов культуры	–(1)

-  2,4 Д диметиламинная соль 720 г/л.
-  Водный раствор.
-  5 л.
-  Срок годности – 3 года.



гербицид

ГЕКСИЛ ЭКСТРА

Назначение: Системный гербицид избирательного действия, предназначенный для борьбы с широким спектром однолетних двудольных сорняков в посевах зерновых колосовых культур и кукурузы.

Применение Гексил Экстра, в. р. в посевах зерновых колосовых культур наиболее эффективно в фазе кущения культуры. Норма расхода Гексил Экстра, в. р. составляет 1,0-1,5 л/га. Для получения стабильного и высокодисперстного раствора необходимо на половину заполнить бак опрыскивателя водой, добавить необходимое количество Гексил Экстра, в. р., перемешать в течение 10-15 секунд, затем медленно наполнить бак водой. Гексил Экстра, в. р. используют однократно в течение одного вегетационного периода в фазу кущения зерновых до выхода в трубку. Первые признаки эффективности наблюдаются через 12-18 часов. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.

-  Эффективность в сложных условиях;
-  Совместимость в баковых смесях;
-  Низкая летучесть;
-  Не влияет на последующие культуры;
-  Уничтожает полынь горькую.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Пшеница яровая, озимая и ячмень яровой	1,0-1,25	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1
Кукуруза	1,0-1,5	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазы 3-5 наст. листьев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	-1



Трифлусульфурон-метил 500 г/кг.



Водно-диспергируемые гранулы.



100 мл.



Срок годности – 3 года.



гербицид

ФЛУРОН

Назначение: Флурон – послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах сахарной свеклы. Уничтожение проблемных сорняков, высокая селективность для растений свеклы на всех стадиях роста. Удобство в применении благодаря высокотехнологичной препаративной формуле.

- Высокая селективность для растений свёклы на всех стадиях развития;
- Удобство применения благодаря высокотехнологичной препаративной формуле.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Свекла сахарная	0,03	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли – 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 200 мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	60 (2)
Свекла сахарная	0,05	Однолетние двудольные, в т.ч. марь белая, щирица	Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли – 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 1,5-2 л/га препаратов на основе десмедифама, фенмедифама и 200 мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (2)

-  С-метолахлор 960 г/л.
-  Концентрат эмульсии.
-  5 л.
-  Срок годности – 3 года.



гербицид

АВАНГАРД

Назначение: Авангард – высокоэффективный довсходовый селективный гербицид против однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков в посевах сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои.

-  *Длительный защитный период: Эффективно подавляет вторую волну сорняков, действуя 8-12 недель;*
-  *Высокая избирательность (селективность): Не вызывает фитотоксичности у кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы и рапса при соблюдении норм;*
-  *Гибкость применения: Низкая летучесть позволяет вносить его без заделки в почву, однако при засухе заделка (3-5 см) усиливает эффект.*
-  *Идеальный компонент смесей: Хорошо сочетается с другими гербицидами для расширения спектра действия.*
-  *Надежность: Эффективно уничтожает сорняки в наиболее критический, ранний период роста культуры.*

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Картофель	1,0-1,5	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры	60 (1)
Подсолнечник, хлопчатник, соя, кукуруза, рапс	1,3-1,6	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры	60 (1)



Фомесафен 95 г/л + хизалофоп-п-этил,
25 г/л + кломазон 230 г/л.



Концентрат эмульсии.



5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

АВАТАР 35%

Назначение: Аватар – Эффективное средство для защиты культур на начальной фазы роста растений. Эффективный контроль сорняков и бурьянов, действует на прорастающие сорняки. Исключает необходимость в проведении обработок гербицидом в междурядьях.

- Широчайший спектр действия: Одновременный контроль злаковых (однолетних и многолетних) и двудольных сорняков, включая устойчивые к другим классам гербицидов;
- Длительный почвенный экран: Кломазон (230 г/л) обеспечивает контроль новых всходов сорняков в течение длительного времени, предотвращая повторное засорение;
- Высокая эффективность против злостных сорняков: Фомесафен (95 г/л) эффективно уничтожает двудольные сорняки, такие как амарант (щирица), которые часто устойчивы к другим гербицидам;
- Системное действие: Хизалофоп-п-этил (25 г/л) эффективно уничтожает злаковые сорняки;
- Гибкость применения: Возможность использования как до всходов, так и на ранних стадиях развития культуры, проявляя высокую избирательность и безопасность для сои;
- Экономическая эффективность: Один препарат заменяет баковые смеси, снижая расходы на логистику и подготовку растворов.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Соя	1,5–2,0	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1–2 ветвлений (тройчатый лист) культуры и в фазе 3–5 листьев сорняков	60 (1)



Никосульфурон 30 г/л +
Мезотрион 75 г/л.



Масляная дисперсия..



1 л/5 л.



Срок годности – 3 года.



гербицид

МАЙСЕР ДУО

Назначение: Гербицид широкого спектра действия, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве против однолетних и многолетних злаковых и некоторых двудольных сорных растений на посевах кукурузы.

- Комплексный контроль злаковых и двудольных однолетних и многолетних сорняков.
 - В рекомендованных нормах применения препарат не токсичен для растений кукурузы и безопасен для птиц, рыб, пчел и почвенных организмов. Рост чувствительных сорняков останавливается в течении 1-2 дней после обработки.
 - Период защитного действия 40-60 дней в зависимости от нормы расхода, видового состава и фазы развития сорняков.
 - Отсутствие фитотоксичности для культуры даже при позднем применении.
 - Легкость применения: контроль широкого спектра сорняков с помощью одного гербицида – нет необходимости искать партнера
- В большинстве опытов отмечено статистически достоверное повышение урожая зерна и зеленой массы кукурузы при использовании гербицида.
- Современная формуляция – масляная дисперсия повышает устойчивость препарата на обработанной поверхности и его проникновение в растение

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, (максимальная кратность обработки)
Кукуруза	1,0-2,0	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних)	-(1)